

## 让孩子们远离疾病

母亲赠与孩子的礼物——对疾病的抵抗力（免疫）会逐渐自然消失，伴随着孩子们的发育成长，外出机会逐渐增多，感染疾病的可能性也逐步提高。

因此，有必要让孩子通过加强自身免疫力来预防疾病，预防接种就是一种有益的办法。

正确理解预防接种，选择孩子身体健康时进行预防接种是十分重要的。

截止到 2008 年 4 月 1 日的信息。最新信息请您咨询各区保健福利中心（保健所）健康课。

### ☆ 免费

☆ 三种混合、二种混合、麻疹风疹混合、日本脑炎等在市内预防接种实施医疗机构（公布在粉红色的展示板上）接种，接种时间一般为每周一至周五。（有些机构需要预约，请您提前直接咨询相关医疗机构。）

☆ 脊髓灰质炎、卡介苗在保健福利中心指定的时间与地点接种。（脊髓灰质炎接种的日程刊登在 3 月 15 日、9 月 15 日的市政信息上。卡介苗接种日程在儿童出生 4 月后的健康检查通知中告知您。）

☆ 接种时请带好母子健康手册，并请保护人一同前往。

☆ 请您向各区保健福利中心（保健所）健康课。

（各区保健福利中心联系方式）

东区保健服务中心 645—1078

博多区保健福利中心 419—1091

中央区保健福利中心 761—7328

南区保健福利中心 559—5116

城南区保健福利中心 831—4261

早良区保健福利中心 851—6012

西区保健福利中心 895—7073

预防接种名		根据规则 实施次数	对象者（市民）		
			对象年龄	最佳接种时期	
三种混合 白喉 百日咳 破伤风	1 期初次	3 次	出生后 3 个月——7 岁 5 个月 (间隔 20 至 56 天, 共实施 3 次)	出生后 3 个月——12 个月	
	1 期追加	1 次	出生后 3 个月——7 岁 5 个月 [与初次接种 (3 次) 间隔 6 个月以上, 实施 1 次]	在初次接种 (3 次) 后, 12 个月——18 个月	
两种混合 白喉 破伤风	2 期	1 次	11 岁、12 岁	11 岁	
麻疹 风疹	1 期	1 次	出生后 12 个月——1 岁 11 个月 * 年满一岁后, 请尽快接种。		
	2 期	1 次	[小学入学前 1 年间(接种时间为从 4 月 1 日至第二年 3 月 31 日间)] 5 岁以上, 未满 7 岁的儿童, 在小学入学日前一年之日至入学前一日		
	从 2008 年 到 2012 年	3 期	1 次	相当于初中 1 年级的年龄 (接种时间为从 4 月 1 日至第二年 3 月 31 日之间)(推荐期间: 4 月~6 月)	
		4 期	1 次	相当于高中 3 年级的年龄 (接种时间为从 4 月 1 日至第二年 3 月 31 日之间)(推荐期间: 4 月~6 月)	
日本脑炎  * 注	1 期初次	2 次	出生后 6 个月——7 岁 5 个月 (间隔 6 至 28 天, 共实施 2 次)	3 岁	
	1 期追加	1 次	出生后 6 个月——7 岁 5 个月 (与初次接种间隔约一年后实施 1 次)	4 岁	
	2 期	1 次	9 岁——12 岁	9 岁	
脊髓灰质炎 (小儿麻痹) * 在各区保健福利 中心实施	2 次	2 次	出生后 3 个月——7 岁 5 个月 (间隔 41 天以上, 共实施 2 次)	出生后 3 个月——18 个月	
卡介苗 * 在各区保健福利 中心实施	1 次	1 次	出生后未满 6 个月	出生后 3 个月——未满 6 个月	

\* 注 目前对日本脑炎的疫苗不做积极的推广。(在充分听取医生关于有损害健康的可能性的说明后个人同意接种的, 并且在同意书中签字后, 方可进行接种。)