

子どもの病気の予防のために

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力（免疫）は、ほとんどが自然に失われますので、発育とともに外出の機会が多くなると、感染症にかかる可能性も高くなります。

そのため、お子さん自身が免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。予防接種について正しく理解し、お子さんの体調の良い時を選んで予防接種を受けることが大切です。

平成20年4月1日現在の情報です。

新しい情報については、各区保健福祉センター（保健所）健康課へお問い合わせください。

予防接種名		対象年齢（望ましい時期）	接種回数等
三種混合 〔ジフテリア 百日せき 破傷風〕	1期 初回	生後3か月～7歳5か月 （生後3か月～12か月が望ましい）	20日から56日までの間隔をにおいて 3回接種
	1期 追加	生後3か月～7歳5か月 （1期初回接種（3回）後、12か月～18か月が 望ましい）	1期初回接種（3回）終了後、6月以上 の間隔をにおいて1回接種
二種混合 〔ジフテリア 破傷風〕	2期	11歳・12歳 （11歳が望ましい）	1回接種
麻しん（はしか） 風しん 平成20年度 から 平成24年度 まで	1期	生後12か月～1歳11か月	1回接種
	2期	小学校入学前の1年間 ※接種期間は、4/1から翌年3/31までの間	1回接種
	3期	中学1年生に相当する年齢 ※接種期間は、4/1から翌年3/31までの間 ※推奨期間は、4月～6月	1回接種
	4期	高校3年生に相当する年齢 ※接種期間は、4/1から翌年3/31までの間 ※推奨期間は、4月～6月	1回接種
日本脳炎	※現在の日本脳炎ワクチンは、積極的な勧奨を差し控えております。（健康被害の可能性について、医師から十分に説明を受けたうえで接種を希望し、かつ、同意書に署名された方については接種できます。） 詳しくは、各区保健福祉センター健康課へ。		
	1期 初回	生後6か月～7歳5か月 （3歳が望ましい）	6日から28日までの間隔をにおいて 2回接種
	1期 追加	生後6か月～7歳5か月 （4歳が望ましい）	1期初回接種（2回）終了後、概ね1年 をにおいて1回接種
2期	9歳～12歳 （9歳が望ましい）	1回接種	
ポリオ ※日程は、市政だより等に 掲載		生後3か月～7歳5か月 （生後3か月～18か月に2回完了するこ とが望ましい）	41日以上の間隔をにおいて 2回投与（実施時期は春と秋の2回）
BCG ※日程は、4か月児健診の 通知でお知らせ		生後6か月未満 （生後3か月～6か月未満が望ましい）	1回接種

★ 料金は無料です。

★ 三種混合、二種混合、麻しん、風しん、日本脳炎は、市内の予防接種実施医療機関（ピンク色（麻しん風しん3期、4期については黄色）のプレートを掲示しています。）で、原則的に毎週月曜日から金曜日に実施しています。（予約制などのところもありますので、前もって医療機関にお問い合わせください。）

★ ポリオ、BCGは、保健福祉センターが日時と場所を指定して実施しています。

- ・ポリオの日程は、市政だよりの3月15日号、9月15日号に掲載。
- ・BCGの日程は、4ヶ月児健診の通知でお知らせします。

★ 接種の際は母子健康手帳を持参のうえ保護者同伴で受けてください。

★ お問い合わせは、各区保健福祉センター（保健所）健康課へ。

東区保健福祉センター Tel. 645-1078

中央区保健福祉センター Tel. 761-7328

城南区保健福祉センター Tel. 831-4261

西区保健福祉センター Tel. 895-7073

博多区保健福祉センター Tel. 419-1091

南区保健福祉センター Tel. 559-5116

早良区保健福祉センター Tel. 851-6012

