

어린이 질병을 예방하기 위해

어머니가 아기에게 선물한 질병에 대한 면역력은 대부분이 자연소실되므로, 발육과 함께 외출의 기회가 늘어남에 따라, 감염증에 걸릴 가능성이 높습니다. 따라서 자신이 스스로 면역을 키워, 질병을 예방할 필요가 있습니다. 이를 돕는 것이, 예방접종입니다. 예방접종에 관하여 바르게 이해하시고, 자녀분의 컨디션이 좋은 때를 골라 예방접종을 받도록 하는 것이 중요합니다.

2008년 4월 1일 현재의 정보입니다.

새로운 정보에 관해서는 각 구청 보건복지센터(보건소)의 건강과로 문의하여 주십시오

☆요금은 무료입니다.

☆3종혼합, 2종혼합, 홍역, 풍진, 일본뇌염은 시내의 예방접종실시 의료기관(핑크색(홍역, 풍진 3기, 4기에 대해서는 황색) 플레이트를 게시하고 있음)에서 원칙적으로 매주 월요일~금요일에 실시하고 있습니다.

(예약제인 곳도 있으니, 사전에 의료기관에 확인 해 주십시오)

☆소아마비, BCG는 건강복지센터가 일시와 장소를 지정하여 실시하고 있습니다. (소아마비일정은 시정알림의 3월 15일호, 9월 15일호에 게재.

BCG 일정은 4개월 아동검진 통지 때, 알려드립니다.)

☆접종 시에는, 모자건강수첩을 지참하시고, 보호자가 동반 해 주십시오.

☆기타 문의사항은 각구청 보건복지센터(보건소)의 건강과 혹은 예방접종 실시의료기관으로 해주십시오

[각구청보건복지센터 연락처]

히가시구보건복지센터 645-1078

하카타구보건복지센터 419-1091

주오구보건복지센터 761-7328

미나미구보건복지센터 559-5116

쇼난구보건복지센터 831-4261

사와라구보건복지센터 851-6012

니시구보건복지센터 895-7073

예방접종명		규칙에 따른 실시회수	대상자(시민)	
			대상연령	바람직한 접종시기
3종혼합 (디프테리아 백일해 파상풍)	1기 첫회	3회	생후 3개월~7세 5개월 (20일부터 56일까지의 간격을 두고 3회 접종)	생후 3개월~12개월
	1기 추가	1회	생후 3개월~7세 5개월 (1기 첫회 접종(3회)후, 6개월이상 간격을 두고 1회)	1기 첫회 접종(3회) 후, 12개월~ 18개월
2종혼합 (디프테리아 파상풍)	2기	1회	11세, 12세	11세
홍역 풍진	1기	1회	생후 12개월~23개월 ※1세가 되면 되도록 빨리 접종을 받으십시오	
	2기	1회	초등학교 입학 전, 1년간 (접종기간은, 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지의 사이) 5세 이상 7세 미만의 아동으로, 초등학교 취학시기에 이른 날을 기준하여, 1년 전의 해당일로부터 당해 시작 기일에 달하는 날의 바로 전일까지의 사이	
	2008년도 부터 2012 년도까지	3기	중학교 1학년생에 상당하는 연령 <접종기간은, 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지의 사이> (추장기간 : 4월~6월)	
		4기	고등학교 3학년생에 상당하는 연령 <접종기간은, 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지의 사이> (추장기간 : 4월~6월)	
일본뇌염 ※주	1기 첫회	2회	생후 6개월~7세 5개월 (6일부터 28일까지의 간격을 두고 2회 접종)	3세
	1기 추가	1회	생후 6개월~7세 5개월 (1기 첫회 종료 후, 대략 1년정도 간격을 두고 1회)	4세
	2기	1회	9세~12세	9세
소아마비(폴리오) ※각구청보건복지 센터에서 실시		2회	생후 3개월~7세 5개월 (41일 이상의 간격을 두고 2회 접종)	생후 3개월 18개월
BCG ※각구청보건복지 센터에서 실시		1회	생후 6개월 미만	생후 3개월~6개월미만

※주 현재, 일본뇌염 백신은, 적극적으로 권장하고 있지 않습니다. (부작용 등의 가능성에 대하여, 의사로부터 충분한 설명을 들으신 후에, 접종을 희망하셔서, 동의서에 서명하신 분에 대해서는 접종할 수 있습니다.)